

Aranesp[®] (Darbepoetina)

- ¿Qué es y para qué se utiliza?

ARANESP[®] cuyo principio activo es darbepoetina, estimula la formación de glóbulos rojos y se utiliza para el tratamiento de:



- Anemia sintomática asociada a insuficiencia renal crónica (IRC) en adultos y pacientes pediátricos.
- Anemia sintomática en pacientes adultos con tumores no mieloides tratados con quimioterapia.

- ¿Cómo se administra?

Su médico le indicará la dosis y pauta correspondiente a administrar.

- En anemia sintomática asociada a insuficiencia renal el tratamiento es indefinido.
- En anemia sintomática en pacientes adultos con tumores no mieloides tratados con quimioterapia el tratamiento se suspenderá aproximadamente 4 semanas después de terminada la quimioterapia.

Debe administrarse la inyección por vía subcutánea tal y como se indica a continuación, cambiando cada vez el lugar de inyección, alternando entre la parte trasera del brazo, el abdomen y la parte superior del muslo (ver dibujo). Sacar la jeringa de la nevera media hora antes de su administración.



1. Lávese las manos con agua y jabón.
2. Desinfecte la zona de punción con alcohol y déjela secar.
3. Pellizque la zona seleccionada.
4. Clave la aguja con el bisel hacia arriba.
5. Suelte ligeramente el pliegue e inyecte el medicamento lentamente.
6. Desinfecte de nuevo.
7. Ejercer una ligera presión, pero sin masajear.

- ¿Qué precauciones debe seguir?

- Debe controlar su presión arterial, especialmente al inicio del tratamiento.
- En algunas ocasiones, según los niveles de hierro en sangre, quizá sea necesario iniciar un tratamiento con suplementos de hierro. En tal caso será su médico quien lo decida y lo prescriba.
- Si padece alguna enfermedad hepática, comuníquese a su médico.
- Si es usted epiléptico, comuníquese a su médico.

- Si está embarazada o en periodo de lactancia.
- Si es alérgico al látex evite manipularlo
- **¿Qué efectos secundarios pueden aparecer?**

Pueden aparecer frecuentemente reacciones en el sitio de inyección: enrojecimiento y/o picores, dolor o hinchazón. Para evitarlo es importante ir cambiando el lugar de inyección. Para evitar el dolor se puede aplicar frío sobre la piel antes de la inyección.

También puede aparecer frecuentemente:

- Aumento de la presión arterial (consulte a su médico si es muy alta)
- Hinchazón de manos y piernas (edema).

- **Conservación:**

No utilice Aranesp[®] después de la fecha de caducidad que aparece en el envase. La fecha de caducidad es el último día del mes que se indica.

- Aranesp[®] ha de conservarse en la nevera (entre 2 y 8°C). Nunca en el congelador.
- Su estabilidad fuera de nevera es de 7 días. Una vez se ha sacado la pluma precargada de la nevera y haya alcanzado la temperatura ambiente (hasta 25°C) se debe utilizar antes de 7 días o desecharse.
- No deje el medicamento al alcance de los niños. Guárdelo en un sitio seguro dentro de la nevera.

- **Contacto**

Deberá dirigirse al Servicio de Farmacia (Sección Atención farmacéutica y Dispensación a Pacientes Externos) con la receta correspondiente firmada por el especialista y la tarjeta sanitaria.

Si tiene alguna duda respecto al medicamento puede contactar con Farmacia en el teléfono: 917277072 ó 912071641 ó por mail : pacientesexternos@gmail.com

Horario de atención a Pacientes Externos:

Lunes -Viernes: 9.00-14.45; y de 16.00-17.00.

- **Recuerde que:**

Tome su medicamento exactamente como le ha indicado su médico.

Informe a su médico o farmacéutico si está tomando o ha tomado recientemente otros medicamentos, incluso los adquiridos sin receta.

Conserve sus medicamentos, siempre que sea posible, en su envase original.

Devuelva la medicación no utilizada a la farmacia del hospital.