

HOJA DE INFORMACIÓN AL PACIENTE

Glivec® (Imatinib)

- ¿Qué es y para qué se utiliza?

Glivec® es un medicamento utilizado para tratar:

- Leucemia mieloide crónica (LMC) en adultos y niños. - Leucemia linfoblástica aguda cromosoma Filadelfia positivo (LLA Ph-positivo).
- Síndromes mielodisplásicos/mieloproliferativos (SMD/SMP).
- Síndrome hipereosinofílico (SHE) y/o leucemia eosinofílica crónica (LEC).
- Tumores del estroma gastrointestinal (GIST).
- Dermatofibrosarcoma protuberans (DFSP).

Glivec actúa inhibiendo el crecimiento de las células anormales en las enfermedades mencionadas anteriormente.


- ¿Cómo se administra?

Siga exactamente las instrucciones de administración de Glivec® indicadas por su médico.

La dosis de 400 mg ó de 600 mg debe administrarse una vez al día, mientras que la de 800 mg debe administrarse en dosis de 400 mg dos veces al día, por la mañana y por la noche.

Tome Glivec con alimentos ya que ello ayudará a disminuir el riesgo de molestias gastrointestinales. Tráguese las cápsulas con un gran vaso de agua.

No abra ni triture las cápsulas a menos que tenga dificultad para tragarlas (por ejemplo, en niños). El contenido de las cápsulas podría entonces diluirse en un vaso de agua o zumo de manzana.



- Si olvida una dosis:

- Tómela lo antes posible. Si ya se acerca el momento de tomar la siguiente dosis, omita la perdida y continúe con toda normalidad.
- En caso de duda, coméntelo con su médico o farmacéutico.
- Recuerde que **NUNCA** debe tomar dos dosis juntas.

- **Si vomita** en menos de 2 horas después de tomar Glivec[®], tome otro comprimido. Si vomita tras más de 2 horas después de tomarlo, no es necesario que tome otro comprimido hasta el próximo que tiene programado de forma regular.

- **¿Qué precauciones debe seguir?**

- Si tiene insuficiencia hepática o insuficiencia cardíaca congestiva.
- Si recibe tratamiento con levotiroxina porque le han extirpado la glándula tiroides
- Si está embarazada o cree que puede estarlo. Glivec[®] no se utilizará durante el embarazo excepto si fuese claramente necesario.

- **¿Qué efectos secundarios pueden aparecer?**

Como todos los medicamentos, Glivec[®] puede tener efectos adversos, aunque no significa que vayan a aparecer en todos los pacientes. Los más comunes son:

- Mientras esté tomando Glivec[®] puede tener retención importante de líquidos. Si aumenta de peso de forma rápida, informe a su médico inmediatamente.

- Otros efectos muy frecuentes: Dolor de cabeza, náuseas, vómitos, diarrea, dolor abdominal, erupción, calambres musculares, dolor muscular y de los huesos e inflamación (incluyendo ojos hinchados e inflamación del tobillo), dolor de las articulaciones, cansancio, aumento de peso. Comente con su médico o farmacéutico si presenta alguno de estos síntomas o cualquier otro que crea que puede estar relacionado con la medicación.

- **Conservación:**

No utilice Glivec[®] después de la fecha de caducidad que aparece en el envase. La fecha de caducidad es el último día del mes que se indica.

Este medicamento no requiere condiciones especiales de conservación.

- **Contacto**

Deberá dirigirse al Servicio de Farmacia (Sección Atención farmacéutica y Dispensación a Pacientes Externos) con la receta correspondiente firmada por el especialista y la tarjeta sanitaria.

Si tiene alguna duda respecto al medicamento puede contactar con Farmacia en el teléfono: 917277072 ó 912071641 ó por mail: pacext.hulp@salud.madrid.org

Horario de atención a Pacientes Externos:

Lunes -Viernes: 8.30-14.45; y de 16.00-17.00.

- **Recuerde que:**

Tome su medicamento exactamente como le ha indicado su médico.

Informe a su médico o farmacéutico si está tomando o ha tomado recientemente otros medicamentos, incluso los adquiridos sin receta.

Conserve sus medicamentos, siempre que sea posible, en su envase original.

Devuelva la medicación no utilizada a la farmacia del hospital.