

## HOJA DE INFORMACIÓN AL PACIENTE

## Nexavar® (Sorafenib)

### - ¿Qué es y para qué se utiliza?

Nexavar® es un medicamento utilizado para tratar:



- Cáncer hepático (Carcinoma hepatocelular).
- Cáncer renal en estadio avanzado (Carcinoma de células renales avanzado).


### - ¿Cómo se administra?

Siga exactamente las instrucciones de administración de Nexavar® indicadas por su médico.

Generalmente, la dosis recomendada es de **dos comprimidos** (400 mg) por la mañana y **dos comprimidos** por la noche, es decir un total de 4 comprimidos/día. Los comprimidos deben tomarse con un vaso de agua.

Se recomienda **tomarlo fuera de las comidas o con una comida baja en grasas.**

**Si le reducen la dosis** a la mitad (2 comprimidos/día), debe tomar los dos comprimidos juntos por la mañana, siguiendo las mismas recomendaciones anteriores..



### - Si olvida una dosis:

- Tómela lo antes posible. Si ya se acerca el momento de tomar la siguiente dosis, omita la perdida y continúe con toda normalidad.
- En caso de duda, coméntelo con su médico o farmacéutico.
- Recuerde que **NUNCA** debe tomar dos dosis juntas.
- **Si vomita** en menos de 2 horas después de tomar Nexavar®, tome otro comprimido. Si vomita tras más de 2 horas después de tomarlo, no es necesario que tome otro comprimido hasta el próximo que tiene programado de forma regular.

- **¿Qué precauciones debe seguir?**

- 1) Ante la frecuente aparición de reacciones cutáneas en manos y pies y exantemas, se recomienda **aplicar crema hidratante** antes y durante la aparición de dichas lesiones.
- 2) La presión arterial debe controlarse regularmente, ya que Nexavar® puede aumentarla.
- 3) El tratamiento con Nexavar® puede dar lugar a un aumento del riesgo de hemorragias. Si va a someterse a una intervención quirúrgica o dental, comuníquese a su médico, ya que Nexavar® puede influir en la cicatrización de la herida
- Los pacientes en tratamiento con Sintrom® deberán realizarse controles regularmente.
- 4) Si padece alguna enfermedad cardíaca, comuníquese a su médico antes de comenzar el tratamiento con Nexavar®.
- 5) Evite quedarse embarazada durante el tratamiento con Nexavar®. Si puede quedar embarazada, durante el tratamiento, tome medidas de contracepción adecuadas.
- 6) Durante el tratamiento con Nexavar® no debe dar el pecho a su bebé.

- **¿Qué efectos secundarios pueden aparecer?**

Como todos los medicamentos, Nexavar® puede tener efectos adversos, aunque no significa que vayan a aparecer en todos los pacientes. Los más comunes son:

- Pueden aparecer muy frecuentemente: trastornos gastrointestinales especialmente diarrea, así como náuseas y vómitos; trastornos de la piel: exantema, rubor y picor en palmas y plantas de los pies que pueden llegar a ser dolorosos, y pérdida de cabello; hipertensión arterial; hemorragias; debilidad o cansancio.
- Con menor frecuencia: enfermedad tipo gripal, estreñimiento, dificultades para tragar, pérdida de peso, falta de apetito, dolores articulares o musculares, alteraciones de la sensibilidad de manos y pies, depresión, problemas de erección (impotencia), ronquera, acné, piel inflamada, seca o escamosa, acúfenos (pitidos en los oídos).

- **Conservación:**

No utilice Nexavar® después de la fecha de caducidad que aparece en el envase. La fecha de caducidad es el último día del mes que se indica.

Este medicamento no requiere condiciones especiales de conservación.

- **Contacto**

Deberá dirigirse al Servicio de Farmacia (Sección Atención farmacéutica y Dispensación a Pacientes Externos) con la receta correspondiente firmada por el especialista y la tarjeta sanitaria.

Si tiene alguna duda respecto al medicamento puede contactar con Farmacia en el teléfono: 917277072 ó 912071641 ó por mail: [pacext.hulp@salud.madrid.org](mailto:pacext.hulp@salud.madrid.org)

**Horario de atención a Pacientes Externos:**

Lunes -Viernes: 8.30-14.45; y de 16.00-17.00.

- **Recuerde que:**

Tome su medicamento exactamente como le ha indicado su médico.

Informe a su médico o farmacéutico si está tomando o ha tomado recientemente otros medicamentos, incluso los adquiridos sin receta.

Conserve sus medicamentos, siempre que sea posible, en su envase original.

Devuelva la medicación no utilizada a la farmacia del hospital.