

**DISPENSACIÓN Y ATENCIÓN FARMACÉUTICA  
A PACIENTES EXTERNOS – H. U. La Paz**

**Tlfnos: 917277072 ó 912071641**

**Mail: [pacext.hulp@salud.madrid.org](mailto:pacext.hulp@salud.madrid.org)**

**Blog: [attfarmaceuticahulp.wordpress.com](http://attfarmaceuticahulp.wordpress.com)**

**¿Qué es Tracleer® y para qué sirve este medicamento?**

Tracleer®, cuyo principio activo es Bosentán, se utiliza en el tratamiento de la Hipertensión Pulmonar para mejorar los síntomas y la capacidad de ejercicio.

**Preparación Extemporánea de Tracleer re-ensado (Bosentán)**

Debido a la baja estabilidad de la suspensión de Bosentán, se recomienda la preparación extemporánea según las siguientes indicaciones:

- **Preparación a partir de los comprimidos reensados** de Tracleer 62,5 mg.
- Sacar el émbolo e introducir el comprimido en interior del cilindro de una jeringa de 10 ml.
- Volver a introducir el émbolo en el cilindro y cargar agua hasta 10 ml.
- Esperar a que los comprimidos se disgreguen en aproximadamente 5 minutos. Agitar. **NO TRITURAR.**
- La suspensión (6,25 mg/mL) sobrante debe desecharse, **NO GUARDARSE**; por no ser estable.
- No mezclar la suspensión con líquidos ácidos (Zumos de frutas)



Partes de una Jeringa

**Si olvida una dosis de Tracleer®**

Si olvida tomar una dosis, tómela lo antes posible. Si ya se acerca el momento de tomar la siguiente dosis, omita la dosis perdida y continúa con toda normalidad. **No** tome una dosis doble para compensar la dosis olvidada.

<u>Dosis (mg)</u>	<u>mL</u>
6, 25 mg	1 ml
12.5 mg	2 ml
18,75 mg	3 ml
25mg	4ml
31.25 mg	5ml

SU DOSIS ES \_\_\_\_\_ Y EQUIVALE A \_\_\_\_\_

- Si tiene alguna duda respecto al medicamento puede contactar con Farmacia en el **teléfono:** 917277072 ó 912071641.

**- Horario de atención a Pacientes Externos:**  
Lunes-Viernes: 8.30-14.45; y de 16.00-17.00