

## HOJA DE INFORMACIÓN AL PACIENTE

### Ribavirina

#### - ¿Qué es y para qué se utiliza?

El principio activo es Ribavirina, es un medicamento que está indicado para el tratamiento de la infección por el virus de la Hepatitis C crónica (VHC) siempre en combinación con otros medicamentos



#### - ¿Cómo se administra?

Cada cápsula contiene 200 mg de Ribavirina. Las cápsulas de este medicamento se administran vía oral diariamente divididas en dos tomas (mañana y noche) con los alimentos, según le indique su médico. No saque el contenido de la cápsula.

#### - Si olvida una dosis:

- Tome/administre la dosis omitida tan pronto como sea posible en el mismo día.
- Si transcurren más de 6 horas, espere a la toma siguiente.
- No tome una dosis doble para compensar las dosis olvidadas.
- No interrumpa el tratamiento ni cambie la dosis de este medicamento sin consultar lo antes con su médico.

#### - ¿Qué precauciones debe seguir?

- Tiene cualquier trastorno sanguíneo, como anemia (bajo recuento celular en sangre), talasemia, anemia de células falciformes.
- Está tomando un medicamento que suprime el sistema inmune (que le protege frente a la infección y algunas enfermedades).

#### - ¿Qué efectos secundarios pueden aparecer?

- Pueden aparecer muy frecuentemente en el tratamiento con Ribavirina:
  - Infección viral y faringitis.
  - Pérdida de peso.
  - Ansiedad, insomnio, disminución de la concentración.
  - Cefaleas, mareo.

- Sequedad de boca, tos seca. La tos seca e irritación de garganta podrá minimizarse bebiendo abundantes líquidos y tomando caramelos.
  - Diarrea, vómitos, náuseas, dolor abdominal.
  - Pérdida de pelo (temporalmente, hasta que termine el tratamiento).
  - Prurito, sequedad cutánea, erupción cutánea. Si aparecen estos síntomas, puede aplicarse crema hidratante para calmar la piel.
  - Dolor musculoesquelético.
  - Anemia (se manifiesta con cansancio).
- Pueden aparecer frecuentemente los siguientes efectos adversos:
- Alteración de la memoria, migraña, pérdida del gusto.
  - Visión borrosa, irritación/dolor ocular, ojo seco.
  - Vértigo, audición alterada, dolor de oídos.
  - Taquicardia.
  - Dermatitis, acné, urticaria.
  - Dolor de espalda y/o extremidades.
- **Conservación:**
- Mantener este medicamento fuera de la vista y del alcance de los niños.
  - No utilice este medicamento después de la fecha de caducidad que aparece en la caja, la funda protectora y el blister después de "CAD". La fecha de caducidad es el último día del mes que se indica.
  - Este medicamento no requiere condiciones especiales de conservación.

- **Contacto**

Deberá dirigirse al Servicio de Farmacia (Sección Atención farmacéutica y Dispensación a Pacientes Externos) con la receta correspondiente firmada por el especialista y la tarjeta sanitaria.

Si tiene alguna duda respecto al medicamento puede contactar con Farmacia en el teléfono: 917277072 ó 912071641 ó por mail: [pacext.hulp@salud.madrid.org](mailto:pacext.hulp@salud.madrid.org)

**Horario de atención a Pacientes Externos:**

Lunes -Viernes: 8.30-14.45; y de 16.00-17.00.

- **Recuerde que:**

Tome su medicamento exactamente como le ha indicado su médico.

Informe a su médico o farmacéutico si está tomando o ha tomado recientemente otros medicamentos, incluso los adquiridos sin receta.

Conserve sus medicamentos, siempre que sea posible, en su envase original.

Devuelva la medicación no utilizada a la farmacia del hospital.