

HOJA DE INFORMACIÓN AL PACIENTE

Imnovid® (Pomalidomida)

¿Qué es y para qué se utiliza?

Imnovid® es un medicamento indicado para el tratamiento del mieloma múltiple resistente o recidivante a tratamientos previos.




¿Cómo se administra?

Siga exactamente las instrucciones de administración de Innovid® indicadas por su médico.

La dosis recomendada es de una cápsula al día, con o sin alimentos, durante 21 días, y una semana de descanso sin tomarlo, para completar el ciclo de 28 días. La cápsula debe tomarse con un vaso de agua, a la misma hora del día, **sin mastigarla, ni triturarla, ni manipularla.**

Si se prescribe junto a **Dexametasona**, se administra habitualmente 1 cápsula de Dexametasona los días 1, 8, 15 y 22 de cada ciclo.



Si olvida una dosis:

- Tome la próxima dosis del día siguiente en el horario habitual. **No tome una dosis extra para compensar la olvidada.**
- En caso de duda, coméntelo con su médico, farmacéutico o enfermero.
- Recuerde que **NUNCA** debe tomar dos dosis juntas.

▪ **¿Qué precauciones debe seguir?**

- Imnovid® es teratogénico (causa defectos congénitos en el feto). No debe utilizarse durante el embarazo.
- Las mujeres en edad fértil deben utilizar medidas anticonceptivas eficaces, sin interrupción, desde 4 semanas antes de iniciar el tratamiento, durante el tratamiento, y 4 semanas después de finalizarlo.
- Los varones deben utilizar preservativo durante el tratamiento y tras 7 días después de finalizarlo, ya que dicho medicamento se encuentra presente en el semen.

▪ **¿Qué efectos secundarios pueden aparecer?**

Como cualquier medicamento, Imnovid® podría producir efectos adversos, lo cual no significa que vayan a aparecer en todos los pacientes:

- Pueden aparecer **muy frecuentemente**:
Anemia, disminución de neutrófilos y plaquetas; Fatiga o cansancio; retención de líquidos; Náuseas, vómitos, diarrea o estreñimiento; Tos; Infecciones, principalmente del tracto respiratorio; neuropatía periférica (hormigueos en extremidades).
- Pueden aparecer **aunque con menos frecuencia**:
Mareos, confusión, vértigos; Dolor pélvico en mujeres;

▪ **Conservación:**

No utilice Imnovid® después de la fecha de caducidad que aparece en el envase. La fecha de caducidad es el último día del mes que se indica.

▪ **Contacto**

Deberá dirigirse al Servicio de Farmacia (Sección Atención farmacéutica y Dispensación a Pacientes Externos) con la receta correspondiente firmada por el especialista y la tarjeta sanitaria.

Si tiene alguna duda respecto al medicamento puede contactar con Farmacia en el teléfono: 917277072 ó 912071641 ó por mail: pacext.hulp@salud.madrid.org

Horario de atención a Pacientes Externos:

Lunes - viernes: 8.30-14.45 y de 16.00-17.00.

▪ **Recuerde que:**

Tome su medicamento exactamente como le ha indicado su médico.

Informe a su médico o farmacéutico si está tomando o ha tomado recientemente otros medicamentos, incluso los adquiridos sin receta.

Conserve sus medicamentos, siempre que sea posible, en su envase original.

Devuelva la medicación no utilizada a la farmacia del hospital.