

## HOJA DE INFORMACIÓN AL PACIENTE

### Pegfilgrastim (Neulasta®)



#### ¿Qué es y para qué se utiliza?

Neulasta®, cuyo principio activo es pegfilgrastim, se usa para reducir la duración de la neutropenia (recuento bajo de glóbulos blancos), y disminuir la incidencia de la neutropenia febril (recuento bajo de glóbulos blancos y fiebre), ambas situaciones comunes tras el uso de la quimioterapia



#### ¿Cómo se administra?

- La dosis recomendada de Neulasta® es de una jeringa por cada ciclo de quimioterapia, administrado en inyección subcutánea aproximadamente 24h después de la quimioterapia.
- Debe administrar la inyección por vía subcutánea tal y como se indica a continuación, alternando el lugar de inyección en cada ciclo entre la parte trasera del brazo, el abdomen y/o la parte superior del muslo (ver dibujo). Conviene sacar la jeringa de la nevera media hora antes de su administración.



1. Lávese las manos con agua y jabón.
2. Desinfecte la zona de punción con alcohol y déjela secar.
3. Pellizque la zona seleccionada.
4. Clave la aguja con el bisel hacia arriba.
5. Suelte ligeramente el pliegue e inyecte el medicamento lentamente.
6. Desinfecte de nuevo, ejerciendo una ligera presión, pero sin masajear.

#### ¿Qué precauciones debe seguir?

Si aparecieran síntomas respiratorios como tos, fiebre y disnea, comuníquese lo inmediatamente a su médico.

Neulasta® puede producir aumento del tamaño del bazo. Si apareciera un dolor en la parte superior izquierda del abdomen o en el hombro izquierdo acuda inmediatamente a su médico.

La cubierta de la aguja de la jeringa contiene caucho natural que puede provocar reacciones alérgicas si usted es alérgico al látex.

- **¿Qué efectos secundarios pueden aparecer?**

-Pueden aparecer muy frecuentemente: dolor de huesos de leve o moderado, pasajero, y en la mayoría de los pacientes se controla con analgésicos comunes. Si no es alérgico a paracetamol, y es el analgésico que utiliza, no supere jamás los 4 gramos diarios.

-Pueden aparecer frecuentemente: dolor y enrojecimiento en el lugar de inyección; dolor de cabeza, dolor general y dolor en las articulaciones, músculos, pecho, extremidades, cuello o espalda.

- **Conservación:**

· Conservar entre 2°C y 8°C (en nevera ).

· La exposición accidental a temperaturas de congelación no afecta a la estabilidad de pegfilgrastim.

· No usar Neulasta ® si observa que la solución no es totalmente transparente, incolora o contiene partículas.

· Neulasta ® puede estar fuera de la nevera a temperatura ambiente (siempre que no supere los 30°C) durante un máximo de 72 horas.

- **Contacto**

Deberá dirigirse al Servicio de Farmacia (Sección Atención farmacéutica y Dispensación a Pacientes Externos) con la receta correspondiente firmada por el especialista y la tarjeta sanitaria. Si tiene alguna duda respecto al medicamento puede contactar con Farmacia en el teléfono: 917277072 ó 912071641 ó por mail: [pacext.hulp@salud.madrid.org](mailto:pacext.hulp@salud.madrid.org)

**Horario de atención a Pacientes Externos:**

Lunes -Viernes: 8.30-14.45; y de 16.00-17.00.

- **Recuerde que:**

Tome su medicamento exactamente como le ha indicado su médico.

Informe a su médico o farmacéutico si está tomando o ha tomado recientemente otros medicamentos, incluso los adquiridos sin receta.

Conserve sus medicamentos, siempre que sea posible, en su envase original.

Devuelva la medicación no utilizada a la farmacia del hospital.