

## HOJA DE INFORMACIÓN AL PACIENTE

### ZYKADIA® (Ceritinib)

#### ▪ ¿Qué es y para qué se utiliza?

Zykadia® cuyo principio activo es ceritinib, es un medicamento indicado en monoterapia para el tratamiento de primera línea de pacientes adultos con cáncer de pulmón no microcítico (CPNM) avanzado, positivo para la quinasa del linfoma anaplásico (ALK), y/o pacientes que han sido previamente tratados con crizotinib.



#### ▪ ¿Cómo se administra?

La dosis recomendada de Zykadia® es de 450 mg (**3 cápsulas** de 150mg) administrados por **vía oral con comida, una vez al día**, a la **misma hora** cada día (la presencia de alimentos es necesaria). Las cápsulas se deben tragar enteras con agua y no se deben masticar ni triturar.

Según la tolerancia al medicamento, podría ser necesario disminuir dosis o interrumpir temporalmente el tratamiento. Siga las instrucciones de su médico.

#### ▪ Si olvida una dosis:

Debe tomarla, a menos que la siguiente dosis esté prevista en las próximas **12 horas**.

#### ▪ Si vomita:

Si aparecieran vómitos durante el tratamiento, el paciente no debe tomar una dosis adicional, sino que debe continuar con la siguiente dosis de la pauta de tratamiento.

#### ▪ ¿Qué precauciones debe seguir?

- Si toma antiH<sub>2</sub> (ej: ranitidina, famotidina...) tómelos ó 10 horas antes ó 2 horas después de la dosis de Zykadia®
- Si toma antiácidos (Ej: Almax®) debe tomarlos ó 2 horas antes ó 2 horas después de la dosis de Zykadia®

- las mujeres en edad fértil de la utilización de métodos anticonceptivos efectivos mientras están tomando Zykadia® y hasta 3 meses después de la interrupción del tratamiento.

▪ **¿Qué efectos secundarios pueden aparecer?**

Como todos los medicamentos, Zykadia® puede tener efectos adversos, lo cual no significa que vayan a aparecer en todos los pacientes.

- Puede aparecer muy frecuentemente:
  - Trastornos gastrointestinales (diarrea, dolor abdominal, náuseas, vómitos y estreñimiento)
  - Cansancio
  - Pérdida de apetito y disminución de peso
  - Erupción cutánea.
  - Anemia

Informe a su médico o farmacéutico inmediatamente si presenta alguno de los siguientes signos o síntomas durante el tratamiento con Zykadia®.

▪ **Conservación:**

Mantener este medicamento fuera de la vista y del alcance de los niños.

No utilice este medicamento después de la fecha de caducidad que aparece en la caja y el blíster después de CAD y EXP. La fecha de caducidad es el último día del mes que se indica.

Este medicamento no requiere ninguna temperatura especial de conservación.

▪ **Contacto**

Deberá dirigirse al Servicio de Farmacia (Sección Atención farmacéutica y Dispensación a Pacientes Externos) con la receta correspondiente firmada por el especialista y la tarjeta sanitaria.

Si tiene alguna duda respecto al medicamento puede contactar con Farmacia en el teléfono: 917277072 ó 912071641 ó por mail: [pacext.hulp@salud.madrid.org](mailto:pacext.hulp@salud.madrid.org)

**Horario de atención a Pacientes Externos:**

Lunes-Viernes: **8:30-14.45h** y de **15.30-17.00h**

▪ **Recuerde que:**

Tome su medicamento exactamente como le ha indicado su médico.

Informe a su médico o farmacéutico si está tomando o ha tomado recientemente otros medicamentos, incluso los adquiridos sin receta.

Conserve sus medicamentos, siempre que sea posible, en su envase original.

Devuelva la medicación no utilizada a la farmacia del hospital.