

HOJA DE INFORMACIÓN AL PACIENTE

Cimzia® (Certolizumab)

- ¿Qué es y para qué se utiliza?

Cimzia®, cuyo principio activo es certolizumab pegol, es un anticuerpo monoclonal que se utiliza para el tratamiento de la artritis reumatoide.




- ¿Cómo se administra?

- Su médico le indicará la pauta correspondiente a administrar. La dosis inicial recomendada es de 400 mg (2 inyecciones de 200mg a la vez) en las semanas 0, 2ª y 4ª, seguido de una dosis de 200 mg (1 inyección) cada 2 semanas.

Debe administrarse la inyección por vía subcutánea tal y como se indica a continuación, cambiando cada vez el lugar de inyección, alternando en el abdomen y la parte superior del muslo.

Para tener menos dolor en el lugar de la inyección conviene sacar la jeringa de la nevera media hora antes de su inyección. No agite la jeringa ya que puede estropear su contenido. Deséchela tras la administración.



1. Lávese las manos con agua y jabón.
2. Desinfecte la zona de punción con alcohol y déjela secar.
3. Pellizque la zona seleccionada.
4. Clave la aguja con el bisel hacia arriba.
5. Suelte ligeramente el pliegue e inyecte el medicamento lentamente.
6. Desinfecte de nuevo, ejerciendo una ligerapresión, pero sin masajear.

- ¿Qué precauciones debe seguir?

Los pacientes en tratamiento con Cimzia® son más susceptibles de padecer infecciones graves: evite el contacto con personas resfriadas o que sufran alguna infección.

El tratamiento no debe iniciarse en pacientes con infecciones activas importantes (crónicas o localizadas). Los pacientes que desarrollen una nueva infección durante el tratamiento con Cimzia® deben ser estrechamente vigilados. Y si desarrolla una nueva infección grave debería interrumpirse el tratamiento hasta su control. (Esta decisión debe de tomarla el médico, no el propio paciente).

A las mujeres en edad fértil se recomienda utilizar un método anticonceptivo eficaz durante el tratamiento con Cimzia® y cinco meses después de la última administración.

- **¿Qué efectos secundarios pueden aparecer?**

Como todos los medicamentos, Cimzia® puede tener efectos adversos, aunque no significa que vayan a aparecer en todos los pacientes. Los más comunes son:

- Reacciones en el sitio de inyección: enrojecimiento y/o picores, dolor o hinchazón. Para evitarlo es importante ir cambiando el lugar de inyección. Para evitar el dolor se puede aplicar frío sobre la piel antes de la inyección.
- Exantema
- Infecciones bacterianas y víricas, por ejemplo: resfriado común, bronquitis, cistitis e infecciones de la piel. Si tiene mucha mucosidad beba mucha agua o líquidos para ayudar a fluidificarla y poder expulsarla con facilidad. Si no cesara o apareciera fiebre persistente, consúltelo a su médico.
- Dolor de cabeza.
- Dolor (cualquier localización), picor (cualquier localización), astenia.

- **Conservación:**

No utilice Cimzia® después de la fecha de caducidad que aparece en el envase. La fecha de caducidad es el último día del mes que se indica.

Cimzia® ha de conservarse en la nevera (entre 2 y 8°C). Nunca en el congelador.

- **Contacto**

Deberá dirigirse al Servicio de Farmacia (Sección Atención farmacéutica y Dispensación a Pacientes Externos) con la receta correspondiente firmada por el especialista y la tarjeta sanitaria.

Si tiene alguna duda respecto al medicamento puede contactar con Farmacia en el teléfono: 917277072 ó 912071641 ó por mail: pacext.hulp@salud.madrid.org

Horario de atención a Pacientes Externos:

Lunes -Viernes: 8.30-14.45; y de 15.30-17.00.

- **Recuerde que:**

Tome su medicamento exactamente como le ha indicado su médico.

Informe a su médico o farmacéutico si está tomando o ha tomado recientemente otros medicamentos, incluso los adquiridos sin receta.

Conserve sus medicamentos, siempre que sea posible, en su envase original.

Devuelva la medicación no utilizada a la farmacia del hospital.