

HOJA DE INFORMACIÓN AL PACIENTE

GIOTRIF® (Afatinib)

▪ ¿Qué es y para qué se utiliza?

Giotrif® es un medicamento indicado para el tratamiento de adultos con carcinoma de pulmón no microcítico localmente avanzado o metastático.

▪ ¿Cómo se administra?

La dosis recomendada es de **40 mg una vez al día**.

Este medicamento se debe **tomar sin alimentos**, es decir, se pueden ingerir alimentos al menos 3 horas antes y 1 hora después de tomar este medicamento.

Los comprimidos se deben **tragar enteros con agua**. Si no puede tragar los comprimidos enteros, podría dispersarlos en 100 ml de agua, sin triturarlos y removiendo durante 15 minutos. No utilizar otros líquidos. La dispersión debe consumirse inmediatamente.

En función de la tolerabilidad al tratamiento su médico podría modificar la dosis (aumentar o disminuirla).



▪ Si olvida una dosis:

- Debe tomar dicha dosis ese mismo día tan pronto como se acuerde, pero si faltan menos de 8 horas para la siguiente dosis programada debe saltarse la dosis olvidada.
- Recuerde que **NUNCA** debe tomar dos dosis juntas.
- Si **vomita** no se le debe administrar una dosis adicional. La siguiente dosis prescrita ha de tomarse en el momento habitual.

▪ ¿Qué precauciones debe seguir?

- Este medicamento contiene lactosa.
- No debe tomar este medicamento durante el embarazo. Podría producir daño fetal.
- Las mujeres en edad fértil, deben utilizar métodos anticonceptivos efectivos durante el tratamiento con Giotrif® y hasta 1 mes después de finalizarlo para evitar el embarazo.

- Se desaconseja a las madres la lactancia materna durante el tratamiento con este medicamento.

▪ **¿Qué efectos secundarios pueden aparecer?**

Como cualquier medicamento, Giotrif® podría causar efectos adversos, lo cual no significa que vayan a aparecer en todos los pacientes. Los más frecuentes son:

- Trastornos gastrointestinales: Diarreas. Náuseas y vómitos.
- Trastornos de la piel: uñeros, dermatitis acneiforme, prurito y piel seca. Recomendamos utilizar crema hidratante por todo el cuerpo.
- Disminución del apetito.
- Sangrado nasal

Con menor frecuencia pueden aparecer:

- Inflamación de la mucosa bucal, heridas bucales. Alteración del gusto. Ojo seco, conjuntivitis. Disminución de peso. Espasmos musculares

▪ **Conservación:**

No utilice Giotrif® después de la fecha de caducidad que aparece en el envase. La fecha de caducidad es el último día del mes que se indica.

Conservar en el embalaje original para protegerlo de la humedad y la luz.

No tire los medicamentos por los desagües ni a la basura.

▪ **Contacto**

Deberá dirigirse al Servicio de Farmacia (Sección Atención farmacéutica y Dispensación a Pacientes Externos) con la receta correspondiente firmada por el especialista y la tarjeta sanitaria.

Si tiene alguna duda respecto al medicamento puede contactar con Farmacia en el teléfono: 917277072 ó 912071641 ó por email: pacext.hulp@salud.madrid.org

Horario de atención a Pacientes Externos: Lunes-Viernes: 8:30-14.45h y de 15.30-17.00h
--

▪ **Recuerde que:**

Tome su medicamento exactamente como le ha indicado su médico.

Informe a su médico o farmacéutico si está tomando o ha tomado recientemente otros medicamentos, incluso los adquiridos sin receta.

Devuelva la medicación no utilizada a la farmacia del hospital.