

HOJA DE INFORMACIÓN AL PACIENTE

VARGATEF® (Nintedanib)

¿Qué es y para qué se utiliza?

Vargatef® está indicado en combinación con docetaxel para el tratamiento de pacientes adultos con cáncer de pulmón no microcítico (CPNM) localmente avanzado, metastásico o localmente recurrente.

¿Cómo se administra?


La dosis recomendada es de 200 mg administrados dos veces al día, con 12 horas de diferencia. Vargatef® se debe tomar **con alimentos**, y tragarse con agua, sin masticar, ni triturar. Se debe tomar de los días 2 al 21 de un ciclo de tratamiento estándar con docetaxel cada 21 días. Vargatef® no se debe tomar el mismo día en el que se administre la quimioterapia con docetaxel (= día 1). Según la tolerancia a Vargatef®, el médico decidirá si disminuir la dosis a 150mg/12h.



- **Si olvida una dosis:** La administración se debe reanudar a la dosis recomendada a la siguiente hora del programa establecido, es decir, no duplicar la dosis para compensar la olvidada.

- Recuerde que **NUNCA** debe tomar dos dosis juntas.

- **Si vomita** no se le debe administrar una dosis adicional. La siguiente dosis prescrita ha de tomarse en el momento habitual.



		2 comp de 100mg								2 comp de 100mg				
--	--	-----------------	--	--	--	--	--	--	--	-----------------	--	--	--	--

¿Qué precauciones debe seguir?

- En las mujeres en edad fértil deben evitar quedarse embarazadas durante el tratamiento y emplear un método anticonceptivo adecuado durante al menos 3 meses después de la última dosis de Vargatef®.
- No debe ser empleado durante el embarazo por el riesgo de daño fetal
- **No tome este medicamento** en caso de ser alérgico a los cacahuets, a la soja o a alguno de los excipientes como la lecitina (soja).

▪ **¿Qué efectos secundarios pueden aparecer?**

- Como cualquier medicamento, Vargatef® podría causar efectos adversos, lo cual no significa que vayan a aparecer en todos los pacientes. Pueden aparecer muy frecuentemente:
 - Diarrea, vómitos, náuseas, dolor abdominal, pérdida de peso. Si apareciese diarrea, deben tratarse con una adecuada hidratación y administración de antidiarréicos.
 - Apetito disminuido.
 - Neuropatía periférica (hormigueos, pérdida de sensibilidad; también asociados a Docetaxel)
 - Mucositis (incluida estomatitis), erupción.
- Pueden aparecer con menos frecuencia: hipertensión arterial (HTA), deshidratación a consecuencia de los vómitos y diarreas.

▪ **Conservación:**

- No utilice Vargatef® después de la fecha de caducidad que aparece en el envase. La fecha de caducidad es el último día del mes que se indica.
- No conservar a una temperatura superior a 25 °C.
- Conservar en el embalaje original para protegerlo de la humedad y la luz.
- No tire los medicamentos por los desagües ni a la basura.

▪ **Contacto**

Deberá dirigirse al Servicio de Farmacia (área de Atención farmacéutica y Dispensación a Pacientes Externos) con la receta correspondiente firmada por el especialista y la tarjeta sanitaria.

Si tiene alguna duda respecto al medicamento puede contactar con Farmacia en el teléfono: 917277072 ó 912071641 ó por mail: pacext.hulp@salud.madrid.org

Horario de atención a Pacientes Externos:

Lunes-Viernes: **8:30-14.45h** y de **15:30-17.00h**

▪ **Recuerde que:**

Tome su medicamento exactamente como le ha indicado su médico.

Informe a su médico o farmacéutico si está tomando o ha tomado recientemente otros medicamentos, incluso los adquiridos sin receta.

Devuelva la medicación no utilizada a la farmacia del hospital.