

## HOJA DE INFORMACIÓN AL PACIENTE

### VOSEVI® (Sofosbuvir/Velpatasvir/Voxilaprevir)


- **¿Qué es y para qué se utiliza?**

VOSEVI® es un medicamento utilizado para el tratamiento la infección crónica por el virus de la hepatitis C.



- **¿Cómo se administra?**

Siga exactamente las instrucciones de administración de VOSEVI® indicadas por su médico. El comprimido debe tomarse sin masticar ni triturar, acompañado de alimentos, 1 vez al día durante 8 ó 12 semanas.



- **Si olvida una dosis:**

- Si no han transcurrido más de 18 horas desde la hora habitual, tómese la dosis olvidada. Si han pasado 18 horas o más, tómela al día siguiente.
- En caso de duda, coméntelo con su médico o farmacéutico.
- Recuerde que **NUNCA** debe tomar dos dosis juntas.

- **Si vomita después de tomar Vosevi** esto puede afectar a la cantidad de fármaco en la sangre. Si vomita en **menos de 4 horas después** de tomar Vosevi, tome otro comprimido. Si vomita tras **más de 4 horas después** de tomar Vosevi, no es necesario que tome otro comprimido hasta el próximo que tiene programado.

- **¿Qué precauciones debe seguir?**

No tome Vosevi si está tomando actualmente alguno de los siguientes medicamentos:

- **Hierba de San Juan** (Hypericum perforatum, medicamento a base de plantas utilizado para tratar la depresión).
  - Si está tomando **Almax o algún otro tipo de antiácido**, tómelo al menos 4 horas antes o al menos 4 horas después de Vosevi.
  - Si está tomando Omeprazol u otro análogo (siempre a una dosis no superior a 20mg), se debe tomar 4 horas después de tomar Vosevi.  
Si necesita tomar dosis altas de estos medicamentos su médico puede darle otro, o ajustar la dosis del que está tomando.
- **¿Qué efectos secundarios pueden aparecer?**

Como todos los medicamentos, VOSEVI® puede tener efectos adversos, aunque no significa que vayan a aparecer en todos los pacientes. Los más comunes son:

- dolor de cabeza
- diarrea, náuseas

Comente con su médico o farmacéutico si presenta alguno de estos síntomas o cualquier otro que crea que puede estar relacionado con la medicación.

• **Conservación:**

No utilice VOSEVI® después de la fecha de caducidad que aparece en el envase. La fecha de caducidad es el último día del mes que se indica.

Este medicamento no requiere condiciones especiales de conservación.

• **Contacto**

Deberá dirigirse al Servicio de Farmacia (Sección Atención farmacéutica y Dispensación a Pacientes Externos) con la receta correspondiente firmada por el especialista y la tarjeta sanitaria.

Si tiene alguna duda respecto al medicamento puede contactar con Farmacia en el teléfono: 917277072 ó 912071641 ó por mail: [pacext.hulp@salud.madrid.org](mailto:pacext.hulp@salud.madrid.org)

<b>Horario de atención a Pacientes Externos:</b>
Lunes-Viernes: <b>8:30-14.45h y de 15.30-17.00h</b>

• **Recuerde que:**

Tome su medicamento exactamente como le ha indicado su médico.

Informe a su médico o farmacéutico si está tomando o ha tomado recientemente otros medicamentos, incluso los adquiridos sin receta.

Conserve sus medicamentos, siempre que sea posible, en su envase original.

Devuelva la medicación no utilizada a la farmacia del hospital.