

**HOJA DE INFORMACIÓN AL PACIENTE**

**XYREM® 500 mg/mL (Oxibato sódico)**

**■ ¿Qué es y para qué se utiliza?**

El principio activo es **oxibato sódico**, es un medicamento utilizado para el tratamiento de la narcolepsia con cataplejía en pacientes adultos.




**■ ¿Cómo se administra?**

- La dosis se ajustará de acuerdo a la eficacia y tolerabilidad obtenida con el fármaco. La dosis se administra **dividida en dos dosis iguales**.
- Xyrem debe tomarse **por vía oral antes de acostarse y de nuevo entre 2,5 y 4 horas después**.
- Deben de haber pasado **2-3h entre la última toma de alimentos y del medicamento**.
- Xyrem viene provisto de una **jeringa graduada y dos vasos dosificadores de 90 ml con tapón de seguridad resistente a niños**. **Cada dosis medida de Xyrem debe dispensarse en el vaso dosificador y diluirse en 60 ml de agua antes de la toma**.

**■ Instrucciones para administración:**

1. Quite el tapón del frasco presionando hacia abajo, y desenrosque hacia la izquierda. Retire la lámina de sellado de plástico, e **inserte el adaptador a presión**.
2. **Inserte la punta de la jeringa** graduada en el centro de la apertura del frasco y haga presión firmemente (Ver Figura 1). Prepare la dosis prescrita tirando del émbolo, manteniendo la botella en posición vertical (Ver Figura 2).
3. Vacíe el medicamento de la jeringa en uno de los vasos dosificadores proporcionados empujando el émbolo (Ver Figura 3). **Agregue entonces aproximadamente 60 ml de agua** al vaso dosificador (60 ml son aproximadamente 4 cucharadas).
4. Ponga el tapón del vaso dosificador y gire cada tapón en el sentido de las agujas del reloj (a la derecha) hasta sentir el click y ciérrelo en la posición a prueba de niños. (Ver Figura 4). Aclare la jeringa con agua.
5. Repetir el proceso de la misma manera para la segunda dosis.



Si considera que el efecto de Xyrem es demasiado intenso o demasiado débil, comuníquese a su médico o farmacéutico

- **Si olvida una dosis:**

- Si olvidó tomar la primera dosis, tómela en cuanto lo recuerde y continúe con el procedimiento descrito previamente. Si omite la segunda dosis, salte esa dosis y no tome Xyrem de nuevo hasta la próxima noche.
- No tome una dosis doble para compensar las dosis olvidadas
- En caso de duda, coméntelo con su médico o farmacéutico.

- **¿Qué precauciones debe seguir?**

- No debe tomar este medicamento durante el embarazo.
- Se desaconseja a las madres la lactancia materna durante el tratamiento con este medicamento.

- **¿Qué efectos secundarios pueden aparecer?**

- Como cualquier medicamento, Xyrem® podría causar efectos adversos, lo cual no significa que vayan a aparecer en todos los pacientes.
- Pueden aparecer muy frecuentemente:
  - Náuseas
  - Mareos, cefaleas.

- **Conservación:**

- Tras la dilución en los vasos dosificadores, la preparación se debe utilizar dentro de las 24 horas posteriores.
- Una vez abierto el frasco de Xyrem, cualquier contenido que no se haya usado en 40 días tras su apertura deberá ser desecharo.

- **Contacto**

Deberá dirigirse al Servicio de Farmacia (Sección Atención farmacéutica y Dispensación a Pacientes Externos) con la receta correspondiente firmada por el especialista y la tarjeta sanitaria.

Si tiene alguna duda respecto al medicamento puede contactar con Farmacia en el teléfono: 917277072 ó 912071641 ó por mail: [pacext.hulp@salud.madrid.org](mailto:pacext.hulp@salud.madrid.org)

<b>Horario de atención a Pacientes Externos:</b>
--

Lunes-Viernes: <b>8:30-14.45h y de 15.30-17.00h</b>
---

- **Recuerde que:**

Tome su medicamento exactamente como le ha indicado su médico.

Informe a su médico o farmacéutico si está tomando o ha tomado recientemente otros medicamentos, incluso los adquiridos sin receta.

Conserve sus medicamentos, siempre que sea posible, en su envase original.

Devuelva la medicación no utilizada a la farmacia del hospital.