

HOJA DE INFORMACIÓN AL PACIENTE

Dupixent® (Dupilumab)



¿Qué es y para qué se utiliza?

Dupixent®, cuyo principio activo es dupilumab, es un anticuerpo monoclonal que se utiliza para el tratamiento de la **dermatitis atópica** de moderada a grave en pacientes adultos


y adolescentes a partir de 6 meses que son candidatos a tratamiento sistémico. También está indicada en otras enfermedades inmunomediadas como el **asma grave eosinofílica**, **prurigo nodular**, **esofagitis eosinofílica** o **rinosinusitis crónica con poliposis nasal**.

¿Cómo se administra?

Su médico le indicará la dosis correspondiente a administrar. La dosis más frecuente para pacientes adultos o adolescentes de más de 60 kg de peso es una dosis inicial de 600 mg (dos inyecciones de 300 mg), seguida de 300 mg (una inyección) cada dos semanas administrados mediante inyección subcutánea (aunque depende de la patología y la edad y peso del paciente pediátrico; existen presentaciones de 200 mg). Si se ha olvidado una dosis, administrar la misma tan pronto como sea posible y seguir la dosificación según la pauta establecida.

Debe administrarse por vía subcutánea, cambiando cada vez el lugar de inyección, alternando entre la parte trasera del brazo, el abdomen y la parte superior del muslo (siendo recomendable la administración en este último). Evitar el área alrededor del ombligo.

Conviene sacar la jeringa de la nevera media hora antes de su inyección. No agite la jeringa ya que se puede estropear su contenido, además el capuchón de la aguja no debe retirarse mientras se espera a que la jeringa precargada alcance la temperatura ambiente. Deséchela tras la administración.



1. Lávese las manos con agua y jabón.
2. Desinfecte la zona de punción con alcohol y déjela secar.
3. Prepare la pluma: primero quite la tapa blanca de la pluma.
4. Pellizque la zona de piel limpia con firmeza.
5. Coloque el extremo de la pluma, que es retráctil, en ángulo recto respecto a la piel pellizcada de forma que pueda ver la ventana (ver dibujo).
6. Con su dedo índice o pulgar presione el botón verde, oírán un "clic" y sentirá un pinchazo. Mantenga presionando contra la piel 15 segundos para asegurar la inyección completa hasta que oiga otro "clic". El indicador de la ventana deja de moverse.
7. Saque la pluma del lugar de inyección en línea recta.
8. Puede que vea una gota de sangre en el lugar de inyección. Limpie con un algodón suavemente, pero sin frotar.

¿Qué precauciones debe seguir?

A las mujeres en edad fértil se recomienda utilizar un método anticonceptivo eficaz durante el tratamiento con Dupixent®. Solamente se debe utilizar dupilumab durante el embarazo si el beneficio potencial justifica el riesgo potencial para el feto.

No administrar el tratamiento si presenta hipersensibilidad al principio activo o a alguno de los excipientes.

¿Qué efectos secundarios pueden aparecer?

Como todos los medicamentos, Dupixent® puede producir efectos adversos, aunque no significa que vayan a aparecer en todos los pacientes. Los más comunes son:

- Reacciones en el sitio de inyección: enrojecimiento y/o picores, dolor o hinchazón.
Para evitarlo es importante ir cambiando el lugar de inyección.
- Conjuntivitis y/o blefaritis (inflamación en los párpados), picor ocular
- Herpes oral.

Conservación:

No utilice Dupixent® después de la fecha de caducidad que aparece en el envase. La fecha de caducidad es el último día del mes que se indica.

Dupixent® ha de conservarse en la nevera (entre 2 y 8°C). Nunca en el congelador.

Dupixent® puede ser conservado a una temperatura máxima de 25 °C durante un único periodo de hasta 14 días; tras el cual, el medicamento no puede ser refrigerado de nuevo. Se debe desechar si no ha sido usado en los 14 días siguientes a su retirada de la nevera.

Contacto

Deberá dirigirse al Servicio de Farmacia (Sección Atención farmacéutica y Dispensación a Pacientes Externos) con la receta correspondiente firmada por el especialista y la tarjeta sanitaria.

Si tiene alguna duda respecto al medicamento puede contactar con Farmacia en el teléfono: 917277072 ó 912071641 ó por mail: pacext.hulp@salud.madrid.org

Horario de atención a Pacientes Externos: Lunes-Viernes: 8:30-14.45h y de 15.30-17.00h
--

Recuerde que:

Tome su medicamento exactamente como le ha indicado su médico.

Informe a su médico o farmacéutico si está tomando o ha tomado recientemente otros medicamentos, incluso los adquiridos sin receta.

Conserve sus medicamentos, siempre que sea posible, en su envase original.

Devuelva la medicación no utilizada a la farmacia del hospital.