

HOJA DE INFORMACIÓN AL PACIENTE

BIMEKIZUMAB (Bimelz® pluma)

¿Qué es y para qué se utiliza?

Bimzelx™ cuyo principio activo es bimekizumab, es un medicamento que se utiliza para el tratamiento de algunas enfermedades mediadas por la inmunidad como psoriasis en placas, artritis psoriásica, espondiloartritis, hidradenitis supurativa u otras.

¿Cómo se administra?

Su médico le indicará la dosis y pauta correspondiente.

- **Si Psoriasis grave, hidradenitis supurativa, Artritis psoriásica grave afectación piel:** Bimzelx se presenta en forma de inyector de pluma de administración subcutánea. Se administran 320 mg (2 plumas) una vez cada 4 semanas durante 16 semanas, es decir en la semana 0, 4, 8, 12 y 16. Y a partir de entonces cada 8 semanas, tal como se refleja en el siguiente esquema:



- **Si Espondiloartritis, Artritis psoriásica:**




Se administran 160 mg (1 pluma) una vez cada 4 semanas.

Saque la pluma de la nevera media hora antes de su inyección. No agitar la pluma.

Compruebe el estado de la pluma (ver figura D). Observe el medicamento a través de la ventana de visualización: debe ser de transparente a ligeramente opalescente y sin partículas. El color puede variar de incoloro a marrón claro amarillento. Es posible que vea burbujas de aire en el líquido, es normal.

Administre la inyección por vía subcutánea tal y como se indica a continuación, cambiando cada vez el lugar de inyección, alternando entre el abdomen, la parte superior del brazo o la parte superior-lateral del muslo.

1. Lávese las manos con agua y jabón
2. Desinfecte la zona de punción con alcohol y déjela secar
3. retire el capuchón de la pluma precargada (E)
4. Sostenga la pluma en un ángulo de 90 grados contra la piel y presione fuertemente (F)
5. La medicación sea administrada aproximadamente en 15 s



¿Qué precauciones debe seguir?

Los pacientes en tratamiento con Bimzelx™ son más susceptibles de padecer infecciones; evite el contacto con personas resfriadas o que sufran alguna infección.

Se recomienda a las mujeres en edad fértil que utilicen un método anticonceptivo eficaz durante y hasta 4 meses después del tratamiento con Bimzelx™. Los datos relativos al uso de bimekizumab en mujeres embarazadas son escasos, por lo que es preferible evitar el uso de Bimzelx durante el embarazo

¿Qué efectos secundarios pueden aparecer?

Como todos los medicamentos, Bimzelx™ puede producir efectos adversos, lo que no significa que vayan a aparecer en todos los pacientes.

Puede aparecer muy frecuentemente:

- Reacciones en el sitio de inyección: enrojecimiento y/o picores, dolor o hinchazón.
- Aumento del riesgo de infecciones, como infecciones de las vías respiratorias altas y candidiasis oral.

Puede aparecer frecuentemente:

- Dolor de cabeza
- Dermatitis-eczema y acné

Conservación:

- No utilice Bimzelx™ después de la fecha de caducidad que aparece en el envase.
 - La fecha de caducidad es el último día del mes que se indica.
- Bimzelx™ ha de conservarse en la nevera (entre 2 y 8°C). Nunca en el congelador.
- La pluma precargada se puede almacenar a una temperatura máxima de 25°C durante un periodo de hasta 25 días. Si no se usa en ese período se debe desechar.
- Protéjalo de la luz.

Contacto

Deberá dirigirse al Servicio de Farmacia (Sección Atención farmacéutica y Dispensación a Pacientes Externos) con la receta correspondiente firmada por el especialista y la tarjeta sanitaria.

Si tiene alguna duda respecto al medicamento puede contactar con Farmacia en el teléfono: 917277072 o 912071641 o por mail: pacext.hulp@salud.madrid.org

Horario de atención a Pacientes Externos: Lunes-Viernes: 8:30-14.45h y de 15.30-17.00h
--

Recuerde:

- Tome su medicamento exactamente como le ha indicado su médico.
- Informe a su médico o farmacéutico si está tomando o ha tomado recientemente otros medicamentos, incluso los adquiridos sin receta.
- Conserve sus medicamentos, siempre que sea posible, en su envase original.
- Devuelva la medicación no utilizada a la farmacia del hospital.