

Skyrizi® (Risankizumab)

- ¿Qué es y para qué se utiliza?

SKYRIZI®, cuyo principio activo es risankizumab, está indicado en el tratamiento de la enfermedad de Crohn en adultos.




- ¿Cómo se administra?

Su médico le indicará la dosis y pauta correspondiente a administrar.

La dosis recomendada inicial es de 600 mg administrados en el hospital de día mediante perfusión intravenosa en la semana 0, semana 4 y semana 8, seguida de 360 mg administrados mediante inyección subcutánea en la semana 12 y, a partir de entonces, cada 8 semanas. Debe administrarse la inyección por vía subcutánea tal y como se indica a continuación, cambiando cada vez el lugar de inyección, alternando entre el abdomen y muslos (ver dibujo).

Sacar la jeringa de la nevera media hora antes de su administración. Debe acudir al hospital de día para el adiestramiento de la administración de la pluma.




Vista lateral

Cierre de la puerta
El lado de la apertura tiene ranuras
La puerta gris debe estar ligeramente abierta
No cierre la puerta gris sin el cartucho en el interior

Protector de la aguja

Aguja en el interior (debajo del protector de la aguja)
No toque la zona del protector de la aguja ni la aguja



- ¿Qué precauciones debe seguir?

- 1) Las mujeres en edad fértil deben utilizar un método anticonceptivo efectivo durante el tratamiento y hasta al menos 21 semanas tras finalizar el tratamiento.
- 2) Si un paciente ha recibido una vacuna de organismos vivos (vírica o bacteriana), se recomienda esperar al menos 4 semanas antes de iniciar el tratamiento.
- 3) Si nota de forma exagerada hinchazón, picor, dolor o enrojecimiento, consulte con su médico ya que puede tratarse de una reacción de hipersensibilidad.
- 4) Si está embarazada o en periodo de lactancia.

- **¿Qué efectos secundarios pueden aparecer?**

Como todos los medicamentos, Skyrizi® puede producir efectos adversos, aunque no significa que vayan a aparecer en todos los pacientes. Los más comunes son:

- Pueden aparecer *muy frecuentemente*: infecciones del tracto respiratorio superior.
- Pueden aparecer *frecuentemente*: reacciones en el sitio de inyección: enrojecimiento y/o picores, dolor o hinchazón (puede evitarlo cambiando el lugar de inyección y para calmar el dolor, aplique frío después de la inyección); infecciones cutáneas por tiña (causadas por hongos en pie, mano, cuerpo, etc); dolores de cabeza y cansancio.

- **Conservación:**

- No utilice Skyrizi® después de la fecha de caducidad que aparece en el envase. La fecha de caducidad es el último día del mes que se indica.
- Skyrizi® ha de conservarse en la nevera (entre 2 y 8°C). Nunca en el congelador.
- Su estabilidad fuera de nevera es de 30 días. Una vez se ha sacado la pluma precargada de la nevera y haya alcanzado la temperatura ambiente (hasta 25°C) se debe utilizar antes de 30 días o desecharse.
- No deje el medicamento al alcance de los niños. Guárdelo en un sitio seguro dentro de la nevera.
- No utilice este medicamento si el líquido está turbio o contiene escamas o partículas grandes.
- Los envases no se deben tirar por los envases ni la basura. Desecharlos en el recipiente que se le ha proporcionado.

- **Contacto**

Deberá dirigirse al Servicio de Farmacia (Sección Atención farmacéutica y Dispensación a Pacientes Externos) con la receta correspondiente firmada por el especialista y la tarjeta sanitaria.

Si tiene alguna duda respecto al medicamento puede contactar con Farmacia en el teléfono: 917277072 o por mail: pacientesexternos@gmail.com

Horario de atención a Pacientes Externos:

Lunes-Viernes: 9.00-14.45; y de 15.30-17.00.

- **Recuerde que:**

Tome su medicamento exactamente como le ha indicado su médico.

Informe a su médico o farmacéutico si está tomando o ha tomado recientemente otros medicamentos, incluso los adquiridos sin receta.

Conserve sus medicamentos, siempre que sea posible, en su envase original.

Devuelva la medicación no utilizada a la farmacia del hospital.